Рекомендации по применению
родентицидного препарата «АБСОЛОН – гранулированная приманка»

Разработаны НПО "Гарант" на основании методических указаний
ЦГСЭН РФ и опыта практического применения средства.

1. Состав и назначение

1.1 Приманка «Абсолон» предназначена для борьбы с различными видами грызунов на объектах различного назначения как в помещениях, так и на открытой территории, подлежащих дератизации. Особо рекомендуется гранулированная приманка для уничтожения мышей.

1.2 «Абсолон» представляет собой высокоэффективную готовую зерновую приманку с содержанием в качестве действующего вещества 0,005% бромадиолона - антикоагулянта 2-го поколения. Основу приманки составляет высокопривлекательные для грызунов зерно и крупы, а также аттрактанты, делающие приманку более привлекательной для грызунов. Летальную дозу грызуны набирают после однократного поедания приманки; гибель грызунов наступает на 4 – 15 день после поедания приманки «Абсолон».

2. Способ применения

Приманку раскладывают на подложки или в специальные контейнеры и размещают по периметру обрабатываемого помещения вблизи мест выхода или кормления грызунов, а также там, где замечены следы их жизнедеятельности (погрызы, экскременты).

3. Нормы расхода

На одну подложку размещают по 15 – 30 г приманки для мышей и по 50 - 80 г для крыс. Подложки расставляют через 3-15 метров в зависимости от захламления помещений и численности грызунов. Приманка добавляется по мере ее поедаемости. Загрязненную и оставшуюся приманку, а также погибших грызунов необходимо сжечь или закопать на глубину не менее 0,5 м.

4. Меры предосторожности

4.1 Хранить приманку отдельно от пищевых продуктов в местах, недоступных детям и домашним животным.

4.2 При работе с приманкой необходимо использовать СИЗ: перчатки, халат, а также соблюдать общие правила личной гигиены: не пить, не курить, не принимать пищу. По окончании работы вымыть руки и лицо с мылом.

4.3 При случайном попадании средства на кожу и слизистые промыть их большим количеством воды. При случайном заглатывании средства необходимо выпить несколько стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем принять 10 измельченных таблеток активированного угля и немедленно обратиться к врачу. Антидот – витамин К (викасол, фитоменадион).

Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.99.01.002.E.002957.07.16 от 15.07.2016 г.
ТУ № 9392-008-43870295-2004
Класс опасности – IV
Срок хранения препарата – 24 месяца с даты изготовления.

По вопросам приобретения препарата и дополнительных консультаций
обращаться в ООО НПО “ГАРАНТ” по адресу:
443077, г.Самара, УЛ. Свободы/Кузнецкая,180/31
тел.(факс) (846) 372-71-70
e-mail: garant1@mail.samtel.ru; www.npo-garant.com