



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эланко Рус»

И.П.Кузнецов

«15» мая 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению Агиты 10 WG для уничтожения мух, тараканов и блох в животноводческих помещениях

(организация-производитель «KWIZDA GmbH»/«КВИЗДА ГмбХ», Австрия)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Агита 10 WG (Agita 10 WG) – инсектицидное средство для уничтожения крылатых мух, тараканов, блох и других членистоногих в животноводческих помещениях и других объектах ветеринарного надзора.

2. Агита 10 WG в качестве действующего вещества содержит тиаметоксам - 10%, а в качестве вспомогательных компонентов - Z-9-трикозен (половой феромон мух), лактозу и сахар.

3. Агита 10 WG представляет собой водорастворимые гранулы бежевого цвета, со специфическим запахом.

4. Выпускают инсектицидное средство расфасованным по 100 г и 400 г в пластмассовые емкости соответствующей вместимости, закрытых металлической фольгой и укуренных пластиковыми крышками с контролем первого вскрытия.

Каждую упаковку маркируют на русском языке с указанием организации-производителя, названия и назначения препарата, названия и содержания действующего вещества, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, надписи «Для животных», информации о подтверждении соответствия, номера государственной регистрации и снабжают инструкцией по применению.

Хранят Агиту 10 WG в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, при температуре от минус 10°C до 30°C.

Срок годности при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня изготовления. По истечении срока годности Агита 10 WG не должна применяться.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Тиаметоксам, входящий в состав препарата, является соединением из группы никотиноидов, обладает контактным и кишечным инсектицидным действием, активен в отношении обитающих в животноводческих помещениях крылатых мух, тараканов, блох и других членистоногих, в т.ч. резистентных к фосфорорганическим инсектицидам, пиретроидам и карбаматам.

Тиаметоксам является антагонистом никотин-ацетилхолиновых рецепторов, вызывает гиперполяризацию мембраны нервного волокна насекомых и приводит к пролонгированному открытию натриевых каналов. Обладает избирательной токсичностью в отношении насекомых, практически не действуя на теплокровных.

Половой феромон мух - Z-9 трикозен обеспечивает привлечение насекомых, а наличие в составе сахара способствует охотному поеданию препарата мухами.

Остаточное инсектицидное действие Агиты 10 WG на поверхностях в зависимости от способа обработки и типа поверхности продолжается 4-8 недель.

6. По степени воздействия на организм Агита 10 WG относится к малоопасным веществам (4 класс по ГОСТ 12.1.007-76); в рекомендуемых концентрациях не обладает местно-раздражающим и сенсibiliзирующим действием. Токсична для рыб и пчел.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Агита 10 WG предназначена для борьбы с окрыленными мухами, комарами, тараканами, блохами и другими насекомыми в помещениях для содержания животных, кормокухнях, профилакториях, изоляторах и на других объектах ветеринарного надзора.

8. Агиту 10 WG применяется в виде рабочего раствора путем нанесения полос (мазков) или опрыскивания поверхностей.

Обработка поверхностей путем нанесения мазков

Рабочий раствор препарата готовят в отдельной емкости, смешивая с водой комнатной температуры, в соотношении: на 400 г Агиты 10 WG - 320 мл воды и перемешивают до получения однородного раствора. Полученного раствора достаточно для обработки помещения площадью пола 160 м².

Раствор наносят на поверхности кистью полосками размером 10x30 см, не менее чем 30 полос.

При использовании 100 г упаковки препарат смешивают с водой в соотношении: на 100 г Агиты 10 WG - 80 мл воды. Приготовленного раствора достаточно для обработки помещения площадью пола 40 м².

Кистью раствор наносят на поверхность полосками размером 10x30 см, не менее чем 8 полосок.

Продолжительность инсектицидного действия при данном методе нанесения препарата – 6-8 недель.

Обработка поверхностей путем опрыскивания

В емкости аппарата для опрыскивания растворить 400 г Агиты 10 WG в 3,2 литра теплой воды и тщательно размешать до получения однородного раствора. Раствором обрабатывают не менее 30% площади поверхности стен и потолка. Полученного раствора достаточно для обработки помещения с площадью пола 80 м².

При использовании 100 г упаковки Агиты 10 WG в емкости аппарата для опрыскивания растворить в 0,8 л теплой воды и тщательно размешать. Полученного раствора достаточно для обработки помещения с площадью пола 20 м².

Продолжительность инсектицидного действия препарата при данном способе обработки - 4-6 недель.

9. Рабочим раствором выборочно обрабатывают поверхности, предпочитаемые насекомыми (теплые солнечные стены, оконные рамы, плафоны светильников и т.п.). В местах, где недостаточно пригодных для нанесения препарата поверхностей, либо там где нежелательно его наносить из-за возможности незначительного обесцвечивания поверхностей, препарат следует нанести на полоски картона или полиэтиленовой ленты и развесить их в помещении.

В свинарниках следует опрыскивать поверхность стен на высоте выше 1,5 м, а на фермах для крупного рогатого скота – выше 2 м.

Препарат не следует наносить на грязные, сильно пористые, либо свежепобеленные поверхности.

10. Раствор препарата должен быть использован сразу же после его приготовления, либо в течение одного дня. Если процесс обработки был приостановлен более чем на 30 минут, раствор следует повторно перемешать.

11. На время проведения обработки из помещения удаляют животных, убирают остатки корма, воды и молочный инвентарь, накрывают полиэтиленовой пленкой доильное оборудование, осуществляют сбор яиц в птичниках.

Ввод животных в помещение разрешается после полного высыхания обработанных поверхностей.

12. Запрещается обрабатывать кормушки и поилки, поверхности, с которыми будут соприкасаться продукты питания или корм, а также поверхности, которые могут облизываться животными.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

13. Все работы с препаратом Агита 10 WG проводят ветеринарные специалисты или лица, обученные безопасной работе с инсектицидными препаратами.

14. К работе с препаратом Агита 10 WG не допускаются лица моложе 18 лет и страдающие аллергическими заболеваниями.

15. Все работы с препаратом и его растворами необходимо проводить в спецодежде (пылезащитная маска, халат, головной убор, резиновые перчатки, сапоги).

16. При приготовлении и применении рабочих растворов Агита 10 WG следует избегать пыления и попадания гранул или раствора на кожу, в глаза и органы дыхания; запрещается принимать пищу, пить и курить.

17. После работы следует тщательно вымыть руки с мылом, рот прополоскать водой.

18. В случае рассыпания гранул, их следует смести с поверхности и затем это место, обильно смочив водой, тщательно вымыть.

19. При попадании препарата или его раствора в дыхательные пути пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух и обратиться за медицинской помощью; при попадании на кожу - смыть большим количеством воды с мылом; при попадании в глаза - немедленно промыть их проточной водой в течение нескольких минут.

20. При появлении признаков отравления пострадавшему следует немедленно обратиться к медицинскому работнику.

21. Неиспользованный раствор утилизируют в специально отведенных местах вдали от источников водоснабжения и мест выпаса скота.

22. Пустую тару из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. Агиту 10 WG следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана компанией ООО «Эланко Рус» (Россия) совместно с компанией «KWIZDA GmbH» (Австрия)

Организация-производитель: КВИЗДА ГмБХ, Лааер штрассе, А-2100 Леобендорф, Австрия / KWIZDA GmbH, Laaer Strasse, A-2100 Leobendorf, Austria