


Министерство здравоохранения Российской Федерации

"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель Департамента
Госсанэпиднадзора
Минздрава России



Монисов
" 14 " 07

№ 11-3/190-09

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению и методам контроля качества
инсектицидного средства "ДОМОВОЙ-ГЕЛЬ"
(ООО "Дезпром", Россия, Краснодар)

"СОГЛАСОВАНО"

Шандала
Председатель Подкомиссии
по дезинфекционным средствам
Федеральной комиссии по МИБП,
Д и ПКС Департамента
госсанэпиднадзора Минздрава
России, академик РАМН



Шандала
М. Г. Шандала

2000 г.

МОСКВА - 2000

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению и методам контроля качества
инсектицидного средства "Домовой-гель"
(ООО "Дезпром", Россия, Краснодар)

Методические указания разработаны в НИИ дезинфектологии МЗ РФ.
Авторы: Костина М. Н., Мальцева М. М.

Методические указания предназначены для работников дезинфекционных станций, центров Госсанэпиднадзора, медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений и других организаций, имеющих право заниматься дезинсекционной деятельностью.

Глава по методам контроля качества средства представлена фирмой-производителем.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство "Домовой-гель" представляет собой однородную бесцветную желеобразную массу, помещенную в контейнер-дозатор: шприц или тубик. Действующим веществом его является хлорпирифос - высокоактивное фосфорорганическое соединение с кишечно-контактной активностью - в количестве 0,5%. В состав геля входят также консервант, стабилизатор, гелеобразующий агент и пищевые добавки до 100%. Срок годности не менее 2 лет в закрытой упаковке.

1.2. Средство "Домовой-гель" обладает острой инсектицидной активностью для тараканов и муравьев (рыжих домовых, черных садовых и др.): их полная гибель наступает через 1-2 суток. Остаточное действие сохраняется 1,5-2 месяца.

1.3. По лимитирующим критериям опасности инсектицидов исследуемый препарат следует отнести: при введении в желудок и нанесении на кожу к IV классу малоопасных средств по ГОСТ 12.1.007-76: пары геля при ингаляции по зоне острого и подострого биоцидного эффекта относятся также к IV классу малоопасных препаратов по Классификации степени опасности средств дезинсекции.

1.4. Средство "Домовой-гель" рекомендуется для использования на объектах различных категорий включая пищевые, лечебные и детские для уничтожения тараканов и муравьев (рыжих домовых, черных садовых и др.).

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ

2.1.1 Перед обработкой провести уборку помещения, собрать остатки пищи, крошки, пищевые отходы и другие источники корма. Плотнo накрыть емкости с водой, закрыть водопроводные краны, лишив насекомых источников влаги.

2.1.2 Гель тонким слоем наносят вдоль плинтусов, щелей и в других местах обнаружения, возможного обитания или передвижения тараканов: под раковинами, за холодильниками, около ведер или бачков для сбора мусора и пищевых отходов, на нижних полках столов, а также около стояков и труб горячего водоснабжения.

2.1.3 Наносить гель следует пунктирной линией: 2 см геля (100 мг) - 2 см необработанной поверхности. При малой и средней численности тараканов интервалы между полосками геля можно увеличить до 4 см: 2 см геля - 4 см необработанной поверхности. То есть 1 упаковка 25 г рассчитана на выборочную обработку помещения площадью ~ 30 м².

2.1.4 Повторные обработки следует проводить не ранее, чем через 3-4 недели. Остатки препарата смывают мыльно-содовым раствором.

2.1.5 Не применять гель одновременно с обработками инсектицидами контактного действия (концентраты эмульсий, смачивающиеся порошки, дусты, средства в аэрозольной упаковке и др.).

2.2 УНИЧТОЖЕНИЕ МУРАВЬЕВ

Для уничтожения рыжих домовых муравьев приманку наносят пунктиром в местах их обнаружения или на путях передвижения ("дорожки") с интервалом 4 см между полосками геля. Норма расхода - 1 упаковка 25 г рассчитана на обработку помещения = 50 м²; при высокой численности муравьев она может быть увеличена, в 1,5-2 раза.

2.2.1 Для уничтожения черных садовых и других видов муравьев, которые, как правило, заползают на

нижние этажи домов, коттеджей, веранд, открытых террас, полосы геля можно наносить не только в помещении, но и снаружи. Норма расхода зависит от численности насекомых.

2.2.2 Повторяют обработки при появлении муравьев.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Избегать контакта состава геля с кожей.

3.2. После окончания работы со средством вымыть руки водой с мылом.

3.3. Контейнеры (шприцы, тубики) не давать детям. Выбрасывать контейнеры, не нарушая их целостности.

3.4. Использовать только по назначению.

3.5. Хранить средство в затемненном помещении, отдельно от пищевых продуктов, в местах не доступных для детей и домашних животных или в складских закрытых помещениях вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При нарушении рекомендуемых мер предосторожности может произойти отравление препаратом. При отравлении во время работы со средством пострадавшего следует вывести на свежий воздух, загрязненную препаратом одежду снять.

4.2. Препарат, попавший на кожу, осторожно удалить ватным тампоном (не втирая), после чего кожу обработать 2% раствором пищевой соды или теплой водой с мылом.

4.3. При попадании препарата в глаза обильно промыть их струей воды или 2% раствором пищевой соды в течение 5-10 минут. При раздражении глаз закапать 30% раствор сульфацила натрия, при болезненности - 2% раствор новокаина.

4.4. При случайном проглатывании препарата необходимо выпить несколько стаканов воды, а затем принять 10-20 таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.